

Centarene

300 EC

HERBISIDA

Bahan Aktif : fluroksipir meptil heptil ester 300 g/l

Golongan : HRAC O

Nomor Pendaftaran : RI. 01030120217034



Herbisida sistemik pra tumbuh dan purna tumbuh berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan untuk mengendalikan gulma berdaun lebar pada tanaman kelapa sawit (TM).

- EFEKTIF UNTUK GULMA BERDAUAN LEBAR DAN SEMAK BELUKAR
- CEPAT TERSERAP DALAM GULMA, TAHAN TERHADAP HUJAN
- DAPAT DICAMPUR DENGAN HERBISIDA GLIFOSAT DAN PARAKUAT
- RESIDU DI DALAM TANAH KECIL

PETUNJUK PENGGUNAAN :

Tanaman	Gulma Sasaran	Dosis Formulasi (Volume air)	Cara dan Waktu Aplikasi
Kelapa Sawit (TM)	Gulma berdaun lebar: <i>Ageratum conyzoides</i> <i>Asystasia gangetica</i> <i>Borreria alata</i> <i>Mikania micrantha</i>	1 - 1.5 l/ha	Penyemprotan volume tinggi dengan volume 400 - 600 l/ha. Aplikasi dimulai saat gulma tumbuh subur dan tidak turun hujan 4 - 6 jam setelah penyemprotan. Apabila belum jelas hubungi petugas pertanian berwenang. *Tidak untuk tanaman padi*

