

HERBISIDA

GOLMATOP

240 EC



Bahan Aktif :

oksifluorfen 240 g/l

Golongan: HRAC E

Nomor Pendaftaran : RI. 01030120206627

KEUNGGULAN

Herbisida kontak dengan spektrum pengendalian gulma yang luas

Tidak bersifat toksik pada burung, ulat tanah dan lebah

Residuality pada tanah 30 - 40 hari



Herbisida selektif kontak pra tumbuh dan purna tumbuh berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan untuk mengendalikan gulma berdaun lebar pada pertanaman bawang merah.

PETUNJUK PENGGUNAAN :

Tanaman	Gulma Sasaran	Dosis Formulasi (Volume Air)	Cara dan Waktu Aplikasi
Bawang merah	Gulma berdaun lebar <i>Ageratum conyzoides</i> <i>Alekanthera sessilis</i> <i>Borreria alata</i> <i>Mimosa invisa</i> <i>Mimosa pudica</i> <i>Oxalis barthieri</i>	1,5 - 3 l/ha	Penyemprotan volume tinggi dilakukan 3 hari sebelum dan sesudah tanam. Aplikasi pada tanah yang sudah diolah. "Tidak untuk tanaman padi"